

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Hepatotoksisitas akibat Pemberian OAT di RSAU Dr. M. Hassan Toto Bogor, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasien tuberkulosis paru yang memiliki status gizi kurang sebanyak 18 (25,7%) pasien
2. Pasien tuberkulosis paru yang mengalami kejadian hepatotoksisitas akibat pemberian OAT sebanyak 11 (18,4%) pasien
3. Ada hubungan yang signifikan antara status gizi dengan pemberian OAT pada pasien tuberkulosis paru di RSAU M. Hassan Toto Bogor dengan p-value = 0,45 ($p < 0,05$)

5.2 Saran

1. Pasien Tuberkulosis Paru
Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi untuk meningkatkan koreksi gizi pada pasien tuberkulosis paru yang menerima OAT
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan faktor risiko lain yang dapat menyebabkan hepatotoksisitas akibat OAT dan menghubungkannya dengan status gizi.